

INFORMACINIS LAPELIS

Atidžiai perskaitykite visą informacinį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

Šio vaisto galima įsigyti be recepto, tačiau jo reikėtų vartoti tiksliai taip, kaip nurodyta, kad poveikis būtų geriausias.

- Neišmeskite lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.

Lapelio turinys

1. Kas yra **Cefakliman mono** ir nuo ko jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant **Cefakliman mono**
3. Kaip vartoti **Cefakliman mono**
4. Galimas šalutinis poveikis
5. **Cefakliman mono** laikymo sąlygos
6. Kita informacija

Cefakliman mono kapsulės

Vienoje kapsulėje yra 5 mg sausojo blakėžudžių (*Cimicifuga*) šakniastiebių ekstrakto (4:1).

Pagalbinės medžiagos: mikrokristalinė celiuliozė, povidonas, koloidinis silicio dioksidas, želatina, titano dioksidas (E 171), eritrozinas (E 127), indigotinas (E 132), raudonasis geležies oksidas (E 172), juodasis geležies oksidas (E 172).

Registravimo liudijimo turėtojas:

Cefak KG
Ostbahnhofstr. 15
87437 Kempten, Vokietija

1. KAS YRA Cefakliman mono IR NUO KO JIS VARTOJAMAS

Vaisto forma ir kiekis pakuotėje

Kapsulės.

Dėžutėje yra 5 arba 10 lizdinių lakštų, kiekviename jų yra 10 kapsulių.

Klimakteriniams sutrikimams gydyti.

Terapinės indikacijos

Klimakteriniai, priešmenstruaciniai ir dismenorėjiniai neurovegetaciniai sutrikimai.

2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT Cefakliman mono

Kontraindikacijos

Nežinomos.

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Nėra.

Vartojimas su maistu ir gėrimais

Cefakliman mono vartoti su maistu ir gėrimais galima.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Duomenų nėra.

Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Cefakliman mono gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.

Kitų vaistų vartojimas

Duomenys nepateikti.

3. KAIP VARTOTI Cefakliman mono

Dozavimas ir vartojimo metodas

Jei nenurodyta kitaip, gerti po 1 kapsulę 2 kartus per parą.

Pavartojus per didelę Cefakliman mono dozę

Perdozavimo atvejų nepastebėta.

Pamiršus pavartoti Cefakliman mono

Praleidus dozę, vėliau vietoj jos dvigubos dozės vartoti negalima.

Pokyčiai, atsirandantys nutraukus Cefakliman mono vartojimą

Pokyčių nepastebėta.

4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Kartais gali sutrikti skrandžio veikla.

5. Cefakliman LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Specialių laikymo sąlygų nereikia.

Ant dėžutės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, preparato vartoti negalima.

6. KITA INFORMACIJA

Daugiau informacijos apie šį vaistinį preparatą gali suteikti vietinis registravimo liudijimo turėtojo atstovas.

Liftas

Raudondvario pl. 76

3026 Kaunas, Lietuva

Tel.: 8 37 223782

Fax: 8 37 229609

E-mail: liftas@liftas.lt

VVKT tvirtinimo data 2004 10 06

Vertė dr. A. Lukošius

Kalbos redaktorė dr. B. Briaukienė