

INFORMACINIS LAPELIS

Atidžiai perskaitykite visą informacinį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

Šio vaisto galima įsigyti be recepto, tačiau jo reikėtų vartoti tiksliai taip, kaip nurodyta, kad poveikis būtų geriausias.

- Neišmeskite lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.

Lapelio turinys

1. Kas yra **Cefamadar** ir nuo ko jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant **Cefamadar**
3. Kaip vartoti **Cefamadar**
4. Galimas šalutinis poveikis
5. **Cefamadar** laikymo sąlygos
6. Kita informacija

Cefamadar tabletės

Vienoje tabletėje yra 250 mg *Madar trit. D4*.

Pagalbinės medžiagos: laktozės monohidratas, magnio stearatas.

Registravimo liudijimo turėtojas:

Cefak KG

Ostbahnhofstr. 15

87437 Kempten, Vokietija

1. KAS YRA Cefamadar IR NUO KO JIS VARTOJAMAS

Vaisto forma ir kiekis pakuotėje

Tabletės.

Dėžutėje yra 5 arba 10 lizdinių lakštų, kiekviename jų yra 20 tablečių.

Nutukimui gydyti.

Paskirtis

Preparatas be patvirtintos indikacijos.

Cefamadar vartojamas pagal homeopatinis gydymo principus nutukimui gydyti.

Pastaba: prieš pradėdami vartoti šį preparatą, pasitirinkite, ar nutukimas nėra ligos pasekmė.

2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT Cefamadar

Kontraindikacijos

Kūdikiams iki vienerių metų šio vaistinio preparato duoti draudžiama.

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Nėra.

Vartojimas su maistu ir gėrimais

Cefamadar vartoti su maistu ir gėrimais galima.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Duomenų nėra.

Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Cefamadar gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.

Kitų vaistų vartojimas

Duomenys nepateikti.

3. KAIP VARTOTI Cefamadar

Dozavimas ir vartojimo metodas

Jei nenurodyta kitaip, gerti po 1 tabletę 1-3 kartus per parą. Jaunesniems kaip 6 metų vaikams vartoti galima ne daugiau kaip pusę, o 6-12 metų vaikams – ne daugiau kaip 2/3 suaugusiems skirtos dozės.

Pavartojus per didelę Cefamadar dozę

Perdozavimo atvejų nepastebėta.

Pamiršus pavartoti Cefamadar

Praleidus dozę, vėliau vietoj jos dvigubos dozės vartoti negalima.

Pokyčiai, atsirandantys nutraukus Cefamadar vartojimą

Pokyčių nepastebėta.

4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Nežinomas.

Pastaba: pradėjus vartoti homeopatinius preparatus, negalavimai iš pradžių laikinai gali pasunkėti.

Tokiu atveju reikėtų pasitarti su gydytoju ir nutraukti preparato vartojimą.

Pajutę šalutinį poveikį, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

5. Cefamadar LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Specialių laikymo sąlygų nereikia.

Ant dėžutės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, preparato vartoti negalima.

6. KITA INFORMACIJA

Daugiau informacijos apie šį vaistinį preparatą gali suteikti vietinis registravimo liudijimo turėtojo atstovas.

Liftas

Raudondvario pl. 76

3026 Kaunas, Lietuva

Tel.: 8 37 223782

Fax: 8 37 229609

E-mail: liftas@liftas.lt

VVKT tvirtinimo data 2004 10 06

Vertė dr. A. Lukošius

Kalbos redaktorė dr. B. Briaukienė